



PRÉPASIMPLE

prepasimple.fr

ECRICOME — 2024

Sujet de mathématiques approfondies

Mathématiques approfondies — Prépa ECG

Annales de concours · Sujet

Exercice 1

À toutes fins utiles, on donne $31^2 = 961$, $32^2 = 1024$, $3^4 = 81$ et $4^4 = 256$.

1. Rappeler en fonction du réel α , la nature de la série

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$$

et de l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$.

On note alors

$$S = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$$

et pour tout entier naturel N non nul :

$$S_N = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2}$$

et

$$R_N = \sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}.$$

2. (a) En étudiant la monotonie de la fonction $t \mapsto \frac{1}{t^2}$, montrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2 :

$$\int_n^{n+1} \frac{dt}{t^2} \leq \frac{1}{n^2} \leq \int_{n-1}^n \frac{dt}{t^2}.$$

(b) En déduire que pour tout entier naturel N non nul :

$$\frac{1}{N+1} \leq R_N \leq \frac{1}{N}.$$

3. Déterminer un entier naturel N_0 tel que : $\forall N \geq N_0, |S_N - S| \leq 10^{-3}$.

4. On pose pour tout entier naturel N non nul : $T_N = S_N + \frac{1}{N+1}$.

(a) Montrer que pour tout entier naturel N non nul :

$$|T_N - S| \leq \frac{1}{N^2}.$$

(b) Déterminer un entier naturel N_1 strictement inférieur à N_0 tel que $\forall N \geq N_1, |T_N - S| \leq 10^{-3}$.

On pose maintenant pour tout couple (n, p) d'entiers naturels non nuls :

$$u_n(p) = \frac{1}{n(n+1) \cdots (n+p)}.$$

5. Soit p un entier naturel non nul.

(a) Donner un équivalent simple de $u_n(p)$ lorsque n tend vers $+\infty$.

(b) En déduire la nature de la série

$$\sum_{n \geq 1} u_n(p).$$

On pose pour tout entier naturel p non nul :

$$U(p) = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(p).$$

6. (a) Déterminer deux réels a, b vérifiant pour tout entier naturel n non nul :

$$u_n(1) = \frac{a}{n} + \frac{b}{n+1}.$$

- (b) En déduire la valeur de $U(1)$.

7. (a) Exprimer, pour tout couple d'entiers naturels (n, p) tel que $n \geq 1$ et $p \geq 2$,

$$u_n(p-1) - u_{n+1}(p-1) \text{ en fonction de } p \text{ et de } u_n(p).$$

- (b) Montrer que pour tout entier naturel p non nul : $U(p) = \frac{1}{p \cdot p!}.$

8. (a) Montrer, par récurrence sur p , que pour tout entier naturel p non nul, pour tout entier naturel n non nul :

$$\frac{1}{n^2} = \frac{p!}{n^2(n+1) \cdots (n+p)} + \sum_{k=1}^p (k-1)! u_n(k).$$

- (b) En déduire que pour tout entier naturel p non nul :

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2(n+1) \cdots (n+p)}$$

converge et

$$S = \sum_{k=1}^p \frac{1}{k^2} + p! \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2(n+1) \cdots (n+p)}.$$

9. En reprenant la méthode de la question 2, que l'on appliquera cette fois à la fonction

$$x \mapsto \frac{1}{x^{p+2}}, \text{ montrer que pour tout couple } (N, p) \text{ d'entiers naturels non nuls :}$$

$$0 \leq \sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{1}{n^2(n+1) \cdots (n+p)} \leq \frac{1}{p+1} \cdot \frac{1}{N^{p+1}}.$$

10. On suppose maintenant que $p = 3$. On pose donc pour tout entier naturel N non nul :

$$U_N = \sum_{k=1}^3 \frac{1}{k^2} + 3! \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2(n+1)(n+2)(n+3)} = \frac{49}{36} + 6 \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2(n+1)(n+2)(n+3)}.$$

Déterminer un entier N_2 tel que $\forall N \geq N_2, |U_N - S| \leq 10^{-3}$.

11. On représente sur la figure 1 l'évolution des erreurs d'approximation de S par S_N , T_N et U_N , respectivement. Commenter ce graphique, à la lumière des réponses apportées aux questions précédentes.




Figure 1 – Évolution des erreurs d'approximation de S par S_N , T_N et U_N .

Les deux axes sont en échelle logarithmique ; N varie de 1 à environ 1200. La courbe en trait plein représente $|S_N - S|$, la courbe en trait mixte $|T_N - S|$ et la courbe en pointillés $|U_N - S|$. Valeurs lues : pour $N = 1$, environ 0,64, 0,14 et 0,034 ; pour $N \approx 1200$, environ $8 \cdot 10^{-4}$, $3,5 \cdot 10^{-7}$ et $7 \cdot 10^{-13}$.

Exercice 2

Dans cet exercice, n désigne un entier naturel non nul, $x_0, \dots, x_n$ des réels deux à deux distincts.

Partie 1

On considère l'application :

$$\Phi : \mathbb{R}_n[x] \longrightarrow \mathbb{R}^{n+1}, \quad P \longmapsto (P(x_0), \dots, P(x_n)).$$

On rappelle que si deux polynômes de degré au plus m coïncident en $m + 1$ points distincts, alors ils sont égaux (m étant un entier naturel).

1. (a) Montrer que Φ est une application linéaire injective.

(b) En déduire que pour tout élément $(y_0, \dots, y_n)$ de $\mathbb{R}^{n+1}$, il existe un unique polynôme P de degré au plus n vérifiant $P(x_0) = y_0, \dots, P(x_n) = y_n$.

Un tel polynôme P est appelé polynôme d'interpolation de Lagrange associé aux points $(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n)$.

2. Montrer que pour tout entier naturel i de $\llbracket 0, n \rrbracket$, il existe un unique polynôme L_i de $\mathbb{R}_n[x]$ vérifiant

$$\forall j \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad L_i(x_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

3. Dans cette question uniquement, on suppose que $x_0 = -1$, $x_1 = 1$, $x_2 = 2$ et $x_3 = 3$.
Expliciter les polynômes L_0 , L_1 , L_2 et L_3 .

4. Montrer que pour tout entier i de $\llbracket 0, n \rrbracket$,

$$L_i(x) = \frac{\prod_{j=0, j \neq i}^n (x - x_j)}{\prod_{j=0, j \neq i}^n (x_i - x_j)}.$$

En déduire pour tout entier i de $\llbracket 0, n \rrbracket$, le degré de L_i et son coefficient dominant.

$\mathcal{L}$ désigne la famille $(L_0, \dots, L_n)$. On considère maintenant pour P et Q deux polynômes de $\mathbb{R}_n[x]$:

$$\langle P, Q \rangle = \sum_{k=0}^n P(x_k)Q(x_k).$$

5. Montrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[x]$.
6. Montrer que $\mathcal{L}$ est une base orthonormée de $\mathbb{R}_n[x]$ pour ce produit scalaire.
7. Montrer que le $(n+1)$ -uplet des coordonnées d'un polynôme P de $\mathbb{R}_n[x]$ dans la base $\mathcal{L}$ est $(P(x_0), \dots, P(x_n))$.

Partie 2

On pose maintenant $N_0 = 1$ et pour tout entier naturel i de $\llbracket 1, n \rrbracket$:

$$N_i(x) = \prod_{j=0}^{i-1} (x - x_j).$$

8. Dans cette question uniquement, on suppose que $x_0 = -1$, $x_1 = 1$, $x_2 = 2$ et $x_3 = 3$.

(a) Expliciter les polynômes N_0 , N_1 , N_2 et N_3 .

(b) Pour tout entier i de $\llbracket 0, 3 \rrbracket$, déterminer les coordonnées $(m_{0,i}, m_{1,i}, m_{2,i}, m_{3,i})$ de N_i dans la base (L_0, L_1, L_2, L_3) . On note alors M la matrice $(m_{i-1,j-1})_{1 \leq i,j \leq 4}$.

(c) Montrer que M est inversible et déterminer M^{-1} .

9. Montrer que $\mathcal{N} = (N_0, \dots, N_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[x]$.

10. (a) Montrer que

$$N_0 = \sum_{k=0}^n L_k.$$

(b) Montrer que pour tout entier naturel i de $\llbracket 0, n \rrbracket$,

$$N_i = \sum_{k=i}^n \left(\prod_{j=0}^{i-1} (x_k - x_j) \right) L_k.$$

11. Donner la matrice de passage A de la base $\mathcal{L}$ vers la base $\mathcal{N}$. La base $\mathcal{N}$ est-elle orthonormée ?

On considère $n + 1$ points $X_0 = (x_0, y_0)$, $\dots$, $X_n = (x_n, y_n)$.

Pour tout entier naturel k de $\llbracket 0, n \rrbracket$, on note P_k le polynôme d'interpolation de Lagrange associé aux points $X_0, \dots, X_k$: c'est l'unique polynôme de degré au plus k vérifiant $P_k(x_0) = y_0$, $\dots$, $P_k(x_k) = y_k$.

12. Justifier l'existence et l'unicité des $n + 1$ réels $a_0, \dots, a_n$ tels que

$$P_n(x) = a_0 N_0(x) + a_1 N_1(x) + \dots + a_n N_n(x).$$

13. Dans cette question uniquement, on admet que $a_0 = y_0$ et que pour tout entier naturel k de $\llbracket 1, n \rrbracket$,

$$a_k = \sum_{i=0}^k \frac{y_i}{\prod_{j=0, j \neq i}^k (x_i - x_j)}.$$

Considérons que les données sont représentées par deux matrices X et Y :

$$X = \begin{pmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad Y = \begin{pmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

En Python, on représentera cela par deux matrices, au format `numpy.array`, comportant chacune $n + 1$ lignes et 1 colonne.

- (a) Écrire une fonction, en langage Python, nommée `prodX` prenant en entrée X , un entier i et un entier k et qui renvoie le produit

$$\prod_{j=0, j \neq i}^k (x_i - x_j).$$

- (b) Écrire une fonction, en langage Python, nommée `coeff` prenant en entrée X et Y et qui renvoie les coefficients $a_0, \dots, a_n$ sous forme d'une matrice.

- (c) Comment utiliser cette fonction pour trouver l'inverse de la matrice de passage A définie à la question 11 ? Combien d'appels de cette fonction sont nécessaires ?

14. (a) Montrer que $a_0 = y_0$ et que a_n est le coefficient du monôme de degré n de $P_n(x)$.

(b) Justifier que

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x).$$

(c) En déduire que

$$a_n = \sum_{i=0}^n \frac{y_i}{\prod_{j=0, j \neq i}^n (x_i - x_j)}.$$

15. Soit k un entier naturel de $\llbracket 1, n-1 \rrbracket$. On pose

$$Q_k(x) = \sum_{j=0}^k a_j N_j(x).$$

(a) Montrer que Q_k est un élément de $\mathbb{R}_k[x]$.

(b) Montrer que, pour tout entier i de $\llbracket 1, k \rrbracket$, $Q_k(x_i) = y_i$.

(c) En déduire que $P_k(x) = a_0 N_0(x) + \cdots + a_k N_k(x)$.

(d) Montrer que

$$a_k = \sum_{i=0}^k \frac{y_i}{\prod_{j=0, j \neq i}^k (x_i - x_j)}.$$

Problème

Partie 1

On considère un paramètre réel $a > 0$, et l'on définit la fonction f sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{a}{\pi(x^2 + a^2)}.$$

1. Justifier que f est une densité de probabilité.
2. Montrer que la fonction de répartition associée à f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$F : x \mapsto \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{1}{2}.$$

Si une variable aléatoire réelle X a pour densité la fonction f , on dit que X suit la loi de Cauchy de paramètre $a > 0$. Lorsque $a = 1$, on dit que X suit la loi de Cauchy standard.

3. Une variable aléatoire X suivant une loi de Cauchy admet-elle une espérance ?
4. Soit X une variable aléatoire réelle. Montrer que X suit la loi de Cauchy standard si et seulement si aX suit la loi de Cauchy de paramètre a .
5. Soit k un entier naturel non nul. Soit x un réel non nul. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par
$$g(t) = \frac{1}{(t^2 + k^2)((x - t)^2 + 1)}.$$

On admet qu'il existe des réels α, β, γ tels que pour tout réel t ,
$$g(t) = \frac{\alpha t + \beta}{t^2 + k^2} + \frac{\alpha(x - t) + \gamma}{(x - t)^2 + 1}.$$

- (a) Montrer que

$$\begin{cases} \beta + \gamma = \alpha x \\ \alpha(x^2 + 1 - k^2) = 2\beta x \\ \beta(x^2 + 1) + \alpha x k^2 + \gamma k^2 = 1 \end{cases}$$

(b) En déduire que

$$\begin{cases} \beta(x^2 + k^2 + 1) + 2\gamma k^2 = 1 \\ 2\beta + \gamma(x^2 + k^2 + 1) = 1 \end{cases}$$

(c) Montrer finalement que $\beta + \gamma k = \frac{k+1}{x^2 + (k+1)^2}$.

(d) Montrer que la fonction G définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$G(t) = \frac{\alpha}{2} \ln \left(\frac{t^2 + k^2}{(x-t)^2 + 1} \right) + \frac{\beta}{k} \arctan \left(\frac{t}{k} \right) + \gamma \arctan(t-x)$$

est une primitive de g .

6. Soit k un entier naturel non nul. Soit X une variable aléatoire de loi de Cauchy de paramètre k et Y une variable aléatoire de loi de Cauchy standard, indépendante de X . On admet que $X + Y$ est une variable aléatoire à densité.

(a) Montrer que la fonction φ est une densité de $X + Y$ où φ est la fonction définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad \varphi(x) = \frac{k}{\pi^2} \left(\lim_{t \rightarrow +\infty} G(t) - \lim_{t \rightarrow -\infty} G(t) \right).$$

(b) En déduire que $X + Y$ suit une loi de Cauchy de paramètre $k + 1$.

7. Montrer par récurrence sur k que, pour tout k entier naturel non nul, si $X_1, \dots, X_k$ sont des variables aléatoires mutuellement indépendantes et suivant toutes la loi de Cauchy de paramètre a , alors $X_1 + \dots + X_k$ suit la loi de Cauchy de paramètre ka .

On pourra se ramener à la question précédente en utilisant la question 4.

Partie 2

8. Soit U une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur $[0, 1]$. Montrer que $Y = a \cdot \tan\left(\pi\left(U - \frac{1}{2}\right)\right)$ suit la loi de Cauchy de paramètre a .
9. Écrire une fonction en langage Python, nommée `cauchy`, prenant en argument un nombre flottant $a > 0$ et simulant une variable aléatoire suivant la loi de Cauchy de paramètre a .

Soient n un entier naturel non nul, $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes suivant toutes la loi de Cauchy de paramètre a et $\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$.

10. Écrire une fonction en langage Python, nommée `realisation`, prenant en argument un entier n et un réel a et renvoyant un vecteur de taille n contenant une réalisation du n -uplet $(X_1, \dots, X_n)$.
11. Écrire une fonction en langage Python, nommée `moyennes`, prenant en argument un entier n et un réel a et renvoyant un vecteur de taille n contenant une réalisation de $(\bar{X}_1, \dots, \bar{X}_n)$.
12. On a représenté sur la figure 2 l'évolution de trois réalisations de ces vecteurs. Commenter cette figure.




Figure 2 – Trois réalisations de $(\bar{X}_1, \dots, \bar{X}_n)$.

Chaque panneau représente $\bar{X}_n$ en fonction de n , pour n allant de 1 à 10^4 , l'axe des abscisses étant en échelle logarithmique. Premier panneau : départ vers $-0,2$, pic vers $6,5$ pour $n = 2$, saut jusqu'à environ 13 vers $n \approx 25$, décroissance jusqu'à environ 0 vers $n \approx 600$, saut à environ $1,7$, chute vers $-0,9$ vers $n \approx 1200$, nouveau saut à environ 5 vers $n \approx 4500$, valeur finale environ $2,5$. Deuxième panneau : valeurs entre $-0,5$ et $1,7$ jusqu'à $n \approx 600$, chute brutale à environ $-3,6$ puis remontée à environ $1,9$ vers $n \approx 680$, valeur finale environ $-1,3$. Troisième panneau : départ vers $-9,6$, remontée progressive jusqu'à environ 0 vers $n \approx 60$, saut à environ $1,7$ vers $n \approx 2800$, valeur finale environ $0,4$.

Partie 3

On considère une suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de variables aléatoires mutuellement indépendantes et suivant toutes la loi de Cauchy de paramètre réel a strictement positif.

On considère un paramètre réel M strictement positif, et l'on pose pour tout entier naturel non nul n :

$$Y_n = \begin{cases} 1 & \text{si } |X_n| \leq M, \\ 0 & \text{si } |X_n| > M. \end{cases}$$

On pose enfin pour tout entier naturel n non nul :

$$\bar{Y}_n = \frac{Y_1 + \dots + Y_n}{n}.$$

- 13.** Déterminer la loi de Y_n , d'abord en fonction de $F(M)$, puis uniquement en fonction de a et de M .
- 14.** Démontrer que $\bar{Y}_n$ converge en probabilité vers une variable aléatoire certaine égale à $p(a) = \frac{2}{\pi} \arctan\left(\frac{M}{a}\right)$.
- 15.** (a) Justifier que $0 < p(a) < 1$ et que $p(a)(1 - p(a)) \leq \frac{1}{4}$.
- (b) On note Φ la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant la loi normale centrée-réduite. Montrer qu'il existe un unique réel z strictement positif vérifiant $\Phi(z) = 0,975$.
- (c) Construire un intervalle de confiance asymptotique au niveau de confiance 95 % de $\arctan\left(\frac{M}{a}\right)$.
- (d) En déduire un intervalle de confiance asymptotique au niveau de confiance 95 % de a .
- 16.** On a représenté l'évolution de ces intervalles de confiance de a pour les valeurs de $a = M = 1$ sur la figure 3. Commenter cette figure.




Figure 3 – Évolution des intervalles de confiance pour $a = M = 1$.

L'axe des abscisses (n de 10^2 à 10^4) est en échelle logarithmique. Valeurs lues : pour $n = 100$, borne inférieure environ $-0,04$ et borne supérieure environ $2,55$ (maximum environ $2,85$ vers $n \approx 110$) ; pour $n = 1000$, environ $0,59$ et $1,31$; pour $n = 10^4$, environ $0,87$ et $1,11$.

17. Quelle(s) qualité(s) attend-on d'un intervalle de confiance ? Commenter la figure 4 quant au choix du paramètre M .




Figure 4 – Évolution des intervalles de confiance pour différentes valeurs de $\frac{M}{a}$.

Les deux panneaux représentent la longueur de l'intervalle de confiance en fonction de n (échelle logarithmique), pour n de 10^2 à 10^4 à gauche et de 10^3 à 10^4 à droite. Valeurs lues pour $n = 10^3$ (panneau de droite) : environ 0,82 pour $\frac{M}{a} = 0,6$, 0,73 pour $\frac{M}{a} = 1$, 0,96 pour $\frac{M}{a} = 2$ et 2,05 pour $\frac{M}{a} = 5$; pour $n = 10^4$: environ 0,28, 0,24, 0,31 et 0,64. Pour $n = 10^2$ (panneau de gauche) : environ 4,2, 2,6, 3,4 et 7,3 respectivement, la courbe $\frac{M}{a} = 0,6$ présentant de fortes oscillations jusqu'à environ 4,8.